



LA PARVOVIROSE

La parvovirose ou gastro-entérite hémorragique du chien est une maladie virale très contagieuse, particulièrement grave, et assez fréquente.

La vaccination est très efficace, mais les chiots sont particulièrement vulnérables.

Leur protection débute par une hygiène stricte et l'emploi d'un désinfectant virucide puissant comme Saniterpen go.



UNE MALADIE QUI PEUT ETRE MORTELLE

Sous la forme la plus courante de la maladie, le chien présente tout d'abord de la fatigue, une perte de l'appétit avec ou sans fièvre. Apparaissent ensuite des signes digestifs : vomissements, diarrhées sanguinolentes entraînant rapidement une déshydratation.

A noter que le virus diminue le système de défense du chien et le rend ainsi plus sensible à d'autres infections, particulièrement respiratoires.

L'incubation dure de 3 jours à quelques semaines. Certaines races (Rottweilers ...) semblent plus sensibles que d'autres.

Il n'existe aucun traitement spécifique. Il faut amener le chien le plus rapidement possible chez le vétérinaire. Celui-ci administrera un traitement symptomatique ; la guérison est possible mais le plus souvent la mort se produit en 3 à 5 jours.

UN VIRUS TRES RESISTANT...

Il s'agit d'un parvovirus. Ce virus est petit, très résistant à la lumière, à la chaleur, à de nombreux détergents et même à l'alcool. Il peut vivre plusieurs mois à l'air libre. Il existe de multiples souches de ce virus car il peut subir de nombreuses mutations.

...ET TRES CONTAGIEUX

Les virus sont excrétés en grande quantité dans les selles des chiens. La transmission peut alors se faire par voie respiratoire ou buccale : le chien se contamine alors en reniflant les excréments des autres chiens. L'autre mode de transmission le plus fréquent est la salive (en jouant par exemple).

LA VACCINATION

La vaccination est le moyen le plus sûr de se prémunir contre la parvovirose.

Et si à la naissance, les chiots sont protégés grâce aux anticorps transmis par la mère, cette quantité d'anticorps va diminuer avec le temps jusqu'à être insuffisante vers l'âge de 5 à 6 semaines. C'est à cette époque que le chiot risque le plus la contamination : la protection maternelle est insuffisante et le système de défense du chiot est encore inachevé.

Ainsi, entre 5 et 8 semaines le chiot est très sensible à la maladie.

C'est pourquoi dans ce cas il est impératif de maintenir un niveau d'hygiène très élevé.

LA PREVENTION PAR L'HYGIENE

La maladie étant très contagieuse et très fréquente, il convient de tenir le chiot hors d'atteinte du virus. Pour cela Saniterpen recommande de :

- Ne pas mettre le chiot en contact avec d'autres chiens.
- Ne pas le promener ni le laisser renifler les excréments d'autres chiens.
- Se laver les mains après avoir été en contact avec un chien et avant de manipuler le chiot.
- Utiliser des sur-chaussures dans la maternité ou la pièce d'élevage, ou laisser ses chaussures à l'extérieur.
- **Nettoyer chaque jour les locaux d'élevage avec Saniterpen Détergent Surpuissant et les désinfecter avec Saniterpen go.**

SANITERPEN go est **homologué** par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche pour le **traitement virucide**, fongicide et bactéricide des locaux d'élevage. De plus, il possède l'**agrément DSV** (Direction des Services Vétérinaires) pour la désinfection dans le cas des **maladies réputées contagieuses**.



Saniterpen go : Homologation n° 2050101 du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche pour les traitements Bactéricide (0,5 %), fongicide (2 %) et virucide (2 %) des logements, matériels de transport et d'élevage des animaux domestiques. Agrément DSV n° 01283 du 26/06/2007 pour la désinfection dans le cas de maladies d'origine bactérienne et virale (y compris fièvre aphteuse) à la dose de 2 %.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant les produits.