



LA PROTECTION LONGUE DURÉE











COMPOSITION

IMIDACLOPRIDE

1g/10g de collier

INSECTICIDE

- Effet létal.
- Elimine les larves de puces dans l'environnement immédiat de l'animal traité.

FLUMETHRINE

0,45g/10g de collier

ACARICIDE

- Effet plaque chauffante (répulsif de contact).
- Effet létal.



CHAT

Taille du collier : 38cm

®serest

MODE D'ADMINISTRATION

- Choisir le collier pour l'animal en fonction de son espèce et de son poids (3 présentations).
- Efficacité longue action : jusqu'à 8 mois en fonction des parasites (7-8 mois pour les puces et 8 mois pour les tiques).

CARACTÉRISTIQUES **DU COLLIER**

- Collier en matrice polymère brevetée.
- Base PVC.
- Huiles neutres (pour une meilleure migration des principes actifs).
- 1 Libération du principe actif selon un gradient de concentration entre le collier et le film lipidique.
- 2 Diffusion du principe actif sur la peau et le poil par le film lipidique.

QUAND UTILISER SERESTO®(9)

- UTILISATION CHEZ LES JEUNES À PARTIR DE
- 10 semaines d'âge chez le chaton.
- 7 semaines d'âge chez le chiot.
- UTILISATION PENDANT LA GESTATION/LACTATION Pas d'étude sur des chiennes et chattes en gestation lactation, l'utilisation du collier n'est donc pas recommandée.
- DOUBLE SYSTÈME DE SÉCURITÉ EN CAS D'ACCROCHAGE (PAS DE RISQUE CHEZ LE CHAT)
- Elargissement du clip de fermeture dès 50 Newtons
- Z'one de moindre résistance rompue dès 80 Newtons.
- TOLÉRANCE

PETIT CHIEN

jusqu'à 8 kg

Seresto

GRAND CHIEN 8 kg et plus

Taille du collier: 70cm

Taille du collier : 38cm

- Bonne tolérance jusqu'à 5x la dose.


· RÉSISTANT À L'EAU

Reste efficace si l'animal est mouillé. Toutefois, éviter une exposition prolongée et intense à l'eau ou un shampouinage intensif car la durée d'activité du produit pourrait s'en trouver réduite.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Les animaux portant le collier ne doivent pas être autorisés à dormir dans le même lit que leurs propriétaires, surtout les enfants.

INDICATIONS



Seresto[®] réduit le risque de transmission de maladies vectorielles.

MALADIES VECTORIELLES = maladies transmises au chien et au chat par :

Les puces Dipylidiose Bartonellose (Maladie des griffes du chat).

Les tiques(3) Borréliose chez le chien (Maladie de Lyme) Babésiose chez le chien (Piroplasmose) Ehrlichiose chez le chien.

répulsif

28 - BAYER HEALTHCARE - 2015