

RATION QUOTIDIENNE CONSEILLÉE

Poids du chien à l'âge adulte	Age du chien						
	1,5 mois	3 mois	6 mois	9 mois	12 mois	18 mois	24 mois
1 kg	30 g	40 g	30 g	30 g	30 g	30 g	105 g
5 kg	100 g	120 g	110 g	105 g	105 g	105 g	235 g
10 kg	155 g	200 g	185 g	200 g	175 g	175 g	345 g
20 kg	295 g	300 g	380 g	325 g	295 g	295 g	670 g
30 kg	320 g	380 g	485 g	420 g	460 g	395 g	830 g
40 kg	350 g	495 g	570 g	670 g	555 g	495 g	495 g
50 kg	375 g	585 g	675 g	790 g	655 g	685 g	585 g
70 kg	450 g	755 g	870 g	1015 g	830 g	865 g	750 g
Repas par jour :	3	3	3	2	2	2	2

A noter : En période de grand froid, l'absorption d'eau glacée peut entraîner des désagréments digestifs significatifs.

Conservation :

Pour préserver pleinement toute la fraîcheur et l'appétence de cet aliment, il est conseillé de refermer soigneusement le sac après chaque utilisation. Le stocker dans un lieu sec, frais et ventilé, afin de le conserver à l'abri de la lumière, de l'humidité et du soleil.

Utiliser de préférence :

avant la date de durabilité minimale imprimée avec le numéro de lot sur l'emballage.

En cas de changement d'alimentation :

Ne modifiez jamais brutalement le régime alimentaire de votre chien. Son organisme peut avoir besoin d'un peu de temps pour s'habituer à une nouvelle croquette. Pour éviter d'éventuelles perturbations digestives, respectez une transition de 8 à 10 jours environ, en mélangeant progressivement ce nouvel aliment à l'ancien produit, jusqu'à substitution complète.

- Jours 1, 2 et 3 : $\frac{3}{4}$ de l'aliment habituel + $\frac{1}{4}$ du nouvel aliment
- Jours 4, 5 et 6 : $\frac{1}{2}$ de l'aliment habituel + $\frac{1}{2}$ du nouvel aliment
- Jours 7, 8 et 9 : $\frac{1}{4}$ de l'aliment habituel + $\frac{3}{4}$ du nouvel aliment
- Jour 10 et suivants : uniquement le nouvel aliment

CONSEILS

Certains chiens nerveux ou particulièrement glorieux peuvent ingurgiter trop rapidement leurs repas. Plus spécifiquement dans le cadre de meutes ou de groupes importants d'individus (concurrence alimentaire). Les risques sont : aérophagie, ballonnements, fausse déglutition (blocage de l'aliment dans l'appareil respiratoire) ou des diarrhées passagères dites de « surconsommation ».

Chez les chiens très actifs ou de grandes races, une vitesse d'ingestion trop rapide peut également entraîner une prédisposition dangereuse au risque de dilatation-torsion de l'estomac. Le fractionnement de la ration quotidienne en deux repas distincts (matin et soir par exemple) et la séparation des gamelles placées dans des endroits calmes et isolés, permettent de limiter fortement ces comportements à risque.